


BIODIVERZITET BILJNOG SVIJETA NA PLANINAMA OKO SARAJEVA

Na području planina Jahorina, Igman, Bjelašnica, Trebević i Visočica obitava veliki broj biljnih vrsta od kojih su mnoge endemične, rijetke ili ugrožene vrste. Neke od biljnih vrsta mogu se naći isključivo na datom lokalitetu.



Gentiana utriculosa L.
Jahorina, Bjelašnica, Trebević,
Visočica, Igman i dr.




Edraianthus serpyllifolius (Vis.) A.DC.
Jahorina, Bjelašnica, Trebević i dr.



Erigeron glabratus Hoppe &
Hornsch. ex Bluff & Fingerh.
Bjelašnica, i dr.



Achillea abrotanoides (Vis.) Vis.
Bjelašnica, i dr.



Lilium bosniacum (Beck ex
Fritsch)
Jahorina, Bjelašnica, Trebević,
Visočica, Igman i dr.



Pedicularis petiolaris Ten.
Jahorina, Bjelašnica i dr.



Phyteuma orbiculare L.
Bjelašnica, i dr.



Dianthus sylvestris Wulfen
Bjelašnica, i dr.



Hypericum montanum L.
Bjelašnica, Trebević, Jahorina
i dr.



Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman
Jahorina, Bjelašnica, Trebević i dr.



Daphne mezereum L.
Bjelašnica, Igman, Čavljak,
Bukovik i dr.



Iris reichenbachii var. *bosniaca* G.
Beck
Bjelašnica, Trebević i dr.

Očuvanje biodiverziteta biljnih vrsta moguće je kroz očuvanje prirodnih staništa, kroz smanjenje zagađenja te kroz ex situ konzervaciju biljnih vrsta. Prikupljanjem sjemena biljnih vrsta i pohranom u bankama sjemena pomažemo očuvanje autohtonih biljnih vrsta.



JAHORINA



BJELAŠNICA


VISOČICA

TREBEVIĆ

IGMAN

OZREN

SARAJEVSKE PLANINE CARSTVO BILJNOG DIVERZITETA



***Erigeron glabratu*s Hoppe & Horsch. ex Bluff & Fingerh.**


Mnogolična suholjetnica se može naći na kamenitim područjima visokoplaninskog pojasa. Na Bjelašnici možemo je naći u području Kotlova u zoni snježanika. Areal vrste je ograničen.



Kotlovi – Bjelašnica

Nadmorska visina: 1784.9 m

Zona snježanika.



***Persicaria vivipara* (L.) Ronse Decr.**
Vivipara u nazivu običnog dvornika označava „živorodnost“, naime cvjetovi rijetko produkuju vijabilno sjeme. Umjesto sjemena biljka proizvodi male, lukovici nalik, strukture iz kojih se razvijaju listovi dok su još pričvršćene za biljku.





SARAJEVSKE PLANINE CARSTVO BILJNOG DIVERZITETA

JAHORINA

BJELAŠNICA

VISOČICA

TREBEVIĆ

IGMAN

OZREN

**Verbascum bosnense** K. Maly

Sinonimi: *V. glabratum* var. *subsbosnense* (K. Maly) Murb.; *V. lanatum* Pančić non Sehrad.

Staništa bosanske divizme su u brdskom pojusu, na otvorenim kamenjarama, rubovima svjetlih šuma. Vrsta je endem jugoistočnih dinarida.

**Achillea lingulata** Waldst. & Kit.

Jezikolista hajdučka trava srodnna je hajdučkoj travi (*Achillea millefolium*). Vrsta ima uzak areal rasprostranjenja.

Nastanjuje Karpate i planine Balkanskog poluotoka. Može se naći na kamenitim mjestima i alpinskim livadama.

**Campanula scheuchzeri** Dominique Villars, 1779

Šojerova zvončika dobila je ime po švicarskom botaničaru Johann Jakob Scheuchzer-u. Vrsta naseljava Iberijski poluotok, Francusku, Apenin, Balkanski poluotok, Centralnu Evropu i Rumuniju.



JAHORINA



BJELAŠNICA

VISOČICA

TREBEVIĆ

IGMAN

OZREN

SARAJEVSKE PLANINE CARSTVO BILJNOG DIVERZITETA

Ozren

Nadmorska visina: do 1000 m



Gentiana acaulis L.

Kohova lincura naseljava područje južne Evrope. Nalazi se na planinskim područjima, naročito u alpinskom pojasu. Vrsta je zbog ljepote cvjetova i njihove čiste intenzivne plave boje dobila i nagradu Kraljevskog hortikulturnog društva (Award of Garden Merit).



Gentiana verna L.

Proljetna lincura je jedna od najmanjih vrsta roda Gentiana, širokog rasprostranjenja. Iako je njen areal dosta širok ova vrsta je zbog rijetkosti navedena kao ugrožena u mnogim evropskim zemljama.



Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Kaćun naseljava Euroaziju, od Evrope do Irana. Vrsta se smatra ugroženom na našem području jer se korijen prikuplja za spravljanje napitka salep. Zbog nekontrolisanog skupljanja populacije ove vrste se smanjuju.



JAHORINA

BJELAŠNICA

VISOČICA

TREBEVIĆ

IGMAN

OZREN



SARAJEVSKE PLANINE CARSTVO BILJNOG DIVERZITETA

Trebević

Nadmorska visina: 1627 m



Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

Medvjede grožđe ili uva je široko rasprostranjena vrsta sa cirkumpolarnim arealom. U određenim područjima vrsta je ugrožena zbog nekontrolisanog branja zbog njenih ljekovitih svojstava. Primjenjuje se u liječenju infekcija urinarnog trakta.



Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase

Medeni kaćun naseljava planine centralne i jugoistočne Evrope i vrsta se nalazi na Crvenoj listi FBiH. Smatra se da ova biljka može da raste ispod površine zemlje i do 15 godina prije nego se pojavi prva stabljika.



Hypericum montanum L.

Ova vrsta roda *Hypericum* naseljava Euroaziju, Maroko i sjevernu Afriku. Gorska pljuskavica je vrsta sroдna kantarionu, ali ljekovita svojstva nisu još ispitana.

