

“चेपाङ्गका लागी चिउरी, चिउरीका लागी चमेरा”

“Let’s work together to maintain delicate balance between
Chepang-Chiuri and Fruit Bats before its too late”

चमेरा संरक्षणमा हातेमालो गरौं ।

थप जानकारीको लागि

साना स्तनधारी प्राणी संरक्षण तथा अनुसन्धान फाउण्डेशन

काठमाडौं नेपाल


पोष्ट बक्स नं : २०२२



‘चेपाङ्का लामी चिउरी, चिउरीका लामी चमेरा’

चमेरा, चेपाङ्ग र चिउरी विद्य रहेको संवतुलन कायम गर्न फलसहरी चमेरा बर्तीउन एक जुट हो ।

“Let's work together to maintain delicate balance between Chepaang-Chiuri and Fruit Bats before its too late”



चेपाङ्ग चिउरी र चमेरा

चेपाङ्ग अर्ध विभाज्य, पिपल अर्धियायी जङ्गली हुन् । माथ सन्तुष्ट पित्त, माकवान्धुर, धदिपु, मोरक, लमजुङ्ग र तम्ही जिल्लामा धेरैपुका भएकी नेपालमा २६ जिल्लामा चेपाङ्गले बसोबास गर्छन् । २०६८ को जनगणना अनुसार ६८,३४५ रहेको चेपाङ्ग समुदाय जल, जङ्गल तथा जमिनले भरिपरे सम्पन्न राख्छन् । चिउरी चेपाङ्गका लागि बहुउपयोगी बनेरफर्पि हो । आर्थिक अर्थमा कमजोर हुनाले चेपाङ्ग चिउरीको फल र विषी बेढेर आर्थिक आम्दानी गर्छन् । चिउरीको विषी फेरेर चिउ बिकाली भेट्नुको रपमा र पिता प्राङ्गाले मलको रपमा प्रयोग वा चिउरी हुने भएकाले चेपाङ्ग र चिउरी सम्पन्न प्रभाव छ । चिउरीका केहि चमेरा चिउरीको कोठाका फुल सँगैसँगै लाग्नेपनि फल बलामे लाग्नेछने उपपक्षमा कमी आएको चेपाङ्ग समुदायको बुझाको छ । पहिले पहिले एउटै रकबाहु ४० पाथीसम्म बिडा मिल्नेथी भने जहिले बुकिमले १० पाथी पति नहुँदा समरवा लिज्नेमा भएको छ ।

चिउरीको उत्पादनमा कमी आउनुको मुख्य कारण

धेरै जसो फलफुले किसानले घरामनेचन बिना फल र बिज दिन सम्वैज् । फलफुले र फलपाख्दा फलसारी चमेरा चिउरीको रस र फल खात भुमिमे गर्दछन् । चिउरीको रस खात चमेराहरु एही रातमा ठीउ ठीउज् धेरै रकबाहु ब्याँछन् । हुज्दा रकबा रस खाँदा चमेराको मुखमा (झरिमा) घरमाहरु (कुलको भाले अङ्ग Androcium) टाँसिन्छन् र अर्को रकबा खाँदा फलको पोथी अङ्ग Gynoecium सँग मिल्न परम्प्रेचन प्रक्रिया पुरा हुन्छ । घरामनेचनको लागि विभिन्न प्राणीको लायकता भएपनि रातौचर प्राणी नली चमेरा आफ्नो ठुलो आकारको कारणले (धेरै घराम बोक्ने) मरुनुपर्छ प्राणी मानिन्छ । किनका केहि चमेरा चिउरीमा जाउने चमेरा भन्दा मरुनुको बजाउने चेपाङ्ग समुदायले पुग्ने देवा स्थानीय जाल भुवा धागेर वा चमेराको शिकार गर्नेले परामनेचन प्रक्रिया पुरा गर्नु हुँदा फल राम्रो सँग दिँदैन । जतः उत्पादनमा कमी आउँदा चिउरीबाट फाइदा तिन गर्नुछन छन । फल पाउने सम्वेमा (झारु लाग्नु) चमेराको प्रजनन बढे सम्म भएकोले एकलकं माउलेने कछा पनि मरुँद भने अर्कोतर्फ किन चिउरीमा राम्रो सँग मरुँद हुँदा कमी ठोउमा चिउरीका बोझहरु हुँदैनन् । चेपाङ्गले फलसारी चमेरा मान्नेले एकलकं चमेराहरु लोप हुन अवस्थामा पुगेका छन् भन्ने लखौतर्फ चिउरीमा राम्रोसँग परामनेचन गर्दा फल राम्रोसँग फलेपनि फल बफलेर चिउरीको उत्पादनमा कमी आएको छ । यसैले चेपाङ्ग, चमेरा र चिउरी एक अर्काका धरिपूरक हुन त्यसैले बैकिक निगधना, चिउरीको उत्पादन बढाउन चेपाङ्गको भित्र चमेराहरु लगाए, चिउरीको बरुसणमा हतबाली गरी ।

चमेराको जानकारी

चमेराहरु लम्बाथरी प्राणी हुन् । विश्वमा चमेराहरु दोस्रो धेरै प्रजातिहरु भएको ‘काइरोपेटल’ बर्गमा पर्छन् । आर्किटेक तथा अन्टार्किटेक महादेश बाहेक सबै क्षेत्रमा पाइने चमेराहरुको विश्वमा १३०० भन्दा बढी प्रजातिहरु छन् । नेपालमा

हलसम्म ४५ प्रजाती अभिलेख भएको छ । लम्बाथरी प्राणीमा चमेराहरु मात्र उड्ने तथा उड्दो भुमिगत सम्वन्ध । फाउण्डल, घर बस्नको रकबाहरुको होवाहरु, टोडाका, पान, बोक्रा, गुफा, पहरा, मानव बस्तीका पुराना घर, मलिवरका घुमान तथा बौलको कोरी चमेराको प्रमुख बाक्लबास हो । चमेराहरु घाँसचरा, मानव स्वास्थ्य र कृषिमा अति नै उपयोगी जीव मानिन्छन् । किनका पाइने चमेराहरु दुई यरीमा वर्गीकृत गरिएको छ ।

का नासासारी चमेरा

का नासासारी चमेरा

विश्वमा पाइने लगभग ५०% चमेराहरु नासासारी छन् । आकारको आधारमा नासासारी चमेरा उर्ल लाग्ने भएपनि लम्बाको आधारमा धेरै छन् । नेपालमा ४० प्रजातीका नासासारी चमेरा पाइन्छन् । यी चमेराहरु धुम्री परिवर्तन प्रणाली प्रयोग गरी तामबुट्टे किरा, फट्याङ्गारक लगायत भ्यानुना, माउमुली, होपारी, मुसा, लाना चरा र चमेराहरु पनि खाँछन् । किनका जस्तै एक चमेराले एक छप्टामा करिब २००० लामबुट्टे तथा कालीबालीमा लाग्ने विभिन्न जलका किराहरु बाहेक वा छाने जसले मानिसहरुलाई प्रत्यक्ष खयोगी पुर्वाहारलेका छन् ।



सा शाकासारी चमेरा

विश्वमा शाकासारी चमेरा लगभग १८६ प्रजाती छन् भने नेपालमा चार प्रजातीका पाइन्छन् । यी प्रजातीले फलफूल, फलको रस, पत्तमा आदी खात रचाउँछन् । यी प्रजातीहरु परामनेचन गरी कृषि उत्पादन बढाउने र बिज चिउरी गरी खनजंगल विलसारमा खयोगी नबै भएकाले बैकिक विविधता संरक्षणमा अति नै उपयोगी मानिन्छन् ।



चमेरा सम्बन्धि जानकारी प्राप्त गर्न

फलसारी चमेराको (बटुरा र अन्य सामा चमेराहरु) कोषी रमह,मसु खीट् बल्ल बलासर, घाब, दम, अखरोट आदी रोगहरु निको हुन्छ भन्ने कुरा सोचन र भम मात्र हो । त्यस्तै बढी चमेराले चिउरीको फल बिनामे, बनेबाको फलफूल गलप फर्ने कुरा सोचो होइन किनकी फलसारी चमेराहरु फाब पाकेका फलफूल खाँने, फलको रस र फल खाँदै घरामनेचन र बिज चिउरीमा गर्ने गर्दछन् । चमेरामा १३५ प्रजातीका चिउरीहरु पाइन्छन् तीमध्ये ६५ प्रजाती चिउरीमा मानिसको लागि खतरनाक छन् ।

चमेराहरु संकटमा पर्नुको मुख्य कारण

- क) वास्तव्यन बिबाध
- ख) वास्तव्यन लायकमण र जहाव
- ग) शिकार
- घ) सचेतता र अध्ययन अनुसन्धानको कमी



शिकार गरी बट्टो बनेबाको संकटमा पर्नुको मुख्य कारण

चमेरा विषयमा

- क) आफ्नो बसोबास र जहावले बसोबास कलाहाडिने ।
- ख) वास्तव्यन संरक्षण गर्ने ।
- ग) चिउरी र फलफूलका बोझहरु रोक्ने ।
- घ) चमेराको मानुको बिकास घोस्ने ।
- ङ) चमेरा जोडामा स्वाभिपलाई अभिप्रेत गर्ने ।



चमेराका फाइदाहरु

१) किराहरुको रोकथाम

मासासारी चमेराहरु तामबुट्टे, भुसुमा, फट्याङ्गारक खाँनेले यी किराहरु र किराबाट गर्ने विभिन्न रोगहरु संरक्षण हुन्छ । यी चमेराहरुले मल, छान, तोरो, अर्को हुवादीहरुमा लाग्ने किराहरु सौदा किताबको हजारी पैसा बर्तीउने मात्र कभर किताबका जीवाणु प्रयोगको कमीले मानव लगायत वातावरणलाई फाइदा पुर्वाउनु । जुन घरमा चमेराहरु बस्दछन् त्यस घरमा अन्य घरको तुलनामा कम



मासासारी चमेराहरु किराहरुको रोकथाम

तामबुट्टे र किराहरु लाग्दछन् । एक चमेराले एक बिडमा आफ्नो झरिमाको एक लिहाइ च्याकेबुटा खात गर्दछन् । एक अनुसन्धानका अनुसार अमेरिकामा मात्र चमेराले बालीबारीमा लाग्ने किराहरु बलात्ते, राम्रो उब्जाउ र किडनासक जीवाणुको प्रयोगमा कमी हुँदा वार्षिक लगभग ढिन खरब ५० अरब पाएका हुन्छ ।

२) परामनेचन

धेरै जसो फलफुले किसानले परामनेचन बिना फल र बिज दिन सम्वैज् । विश्वमा ५०३ भन्दा बढी प्रजातीका फलहरु र ६० भन्दा बढी प्रजातीका बलस्पती मुख्यतः परामनेचनको लागि फलसारी चमेरामा भर पर्छन् । चमेराहरुले विभिन्न जलका फलफूल जस्तै केरा, जार, चिउरी आदीमा रस कुस्न आउँदा फलको पतन (भाले अङ्ग Androcium) चमेराको झरिमा टाँसिने र अर्को फलमा जोडा फलको (पोथी अङ्ग Gynoecium)सँग पुग्नुछ र परामनेचन प्रक्रिया पुरा भई बोटमा फल दिन्छ । चिउरीको उत्पादनमा कमी आउनुको मुख्य कारण परामनेचनमा खयोगी भन्ने शाकासारी चमेरा मान्नु हो ।




३) चिउरीबाट

चमेराहरुले फलफुलहरु एक ठाँउबाट बोकी जहाँ डाउँमा लगेर खाँने र बिड त्यहि वा उड्दा कोरे समारोह । उपयुक्त समयमा चिउरीबाट चिउरी मिल्दछ र बग्नजुनहरु बढाउने काम गर्दछ । मानिसहरुले यसलाई उच्च प्रोड्युको किताब पनि भन्दछन् ।

४) विषदा

चमेराको छिटा सताउने उक्ताउ प्राङ्गारिक मलहरु मध्ये पर्छ । पहिले पहिले किसानले चमेराको गुफा नजिक बस्ने र चमेराको छिटा निकाली आफ्नो बनेबामा रहेका फलफुलहरु र सेबबारीमा प्रयोग गरी बालीबारी सुरार्थ ।



छिटाको विषदा फलफूलमा लाग्ने छिटाको विषदा

“चेपाङ्गका लागी चिउरी, चिउरीका लागी चमेरा”

चमेरा, चेपाङ्ग र चिउरी विच रहेको सन्तुलन कायम गर्न फलहारी चमेरा बचाउन एक जुट हो ।

“Let's work together to maintain delicate balance between Chepang-Chiuri and Fruit Bats before its too late”



शाकाहारी चमेरा

- विश्वमा लगभग १८६ प्रजातीका शाकाहारी चमेराहरू छन् ।
- नेपालमा चार प्रजातीका शाकाहारी चमेरा पाइन्छन् ।
- यी प्रजातीले फलफूल, फुलको रस, पराग आदी खान रुचाउँछन् ।
- यी प्रजातीहरू परागसेचन, विज वितरण गरी जंगल विस्तारमा सहयोग गर्ने भएकाले जैविक विविधता संरक्षणमा अति नै उपयोगी मानिन्छन् ।
- परागसेचन र विजवितरण गरी कृषि उत्पादन बढाई किसानलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिन्छन् ।

चमेराका फाईदाहरू

- मांसाहारी चमेरा किराहरूको रोकथाममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् ।
- परागसेचन, विजवितरण र वनजंगल विस्तारमा शाकाहारी चमेराको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
- चमेराको विष्टा संसारको उत्कृष्ट प्राङ्गारिक मलहरू मध्ये पर्दछ ।
- चमेरा पर्यटनबाट समुदायको जिविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने जान्छ ।

संरक्षणका चुनौतिहरू

- बासस्थान विनास
- बासस्थान अतिक्रमण र अभाव
- शिकार
- सचेतना अभाव

कसरी बचाउने

- आफूले नमान्ने र अरुलाई नमान्न सल्लाह दिने
- बासस्थान संरक्षण गर्ने
- चिउरी र फलफूलका बोटहरू रोप्ने
- चमेराको मासुको विकल्प खोज्ने
- चमेरा जोगाउन स्थानियलाई अभिप्रेरित गर्ने

चमेरा संरक्षणमा हतैमालो गरौं ।



थप जानकारीको लागि
साना स्तनधारी प्राणी संरक्षण तथा अनुसन्धान फाउण्डेशन
काठमाडौं नेपाल
पोष्ट बक्स नं : १०५२
फोन नं : ९७७-९८६०५६२५४ (हरि बस्नेत)

