

## Gavilán Colilargo

El gavilán colilargo (*Accipiter gundlachi*) es un ave rapaz de la familia Accipitridae, miembro del género *Accipiter*, endémica de Cuba.



### **Características**

Es una rapaz hermosa. Sus alas, relativamente cortas y redondeadas y su larga cola, unidas a una visión binocular, le permiten maniobrar entre la vegetación con gran habilidad. La hembra es mucho mayor que el macho. Miden entre 43-51cm; de tamaño medio. Los adultos son de color gris-azulado oscuro en las partes superiores con un casquete negruzco, y un barreado rojizo en las partes interiores. Los inmaduros son de color marrón arriba y más pálidos abajo, pero con un estriado oscuro. El final de la cola es redondeado al vuelo. Los ojos son rojos.

**Especie Similar:** *Gavilancito*, es de menor tamaño y tiene el final de la cola cuadrada al vuelo.

**Voz:** un fuerte *kek-kek-kek* ....como cacareo


### **Alimentación**

Sus presas principales son aves, incluyendo las aves de corral. También caza un gran número de roedores, muchos de los cuales, causan grandes pérdidas a los agricultores.

### **Reproducción**

Se reproducen entre febrero y mayo. El nido, por lo general, está construido cerca del tronco de árboles altos y pinos y por debajo de la copa. Puede poner entre 3 y 4 huevos.

---



## Hábitat

Se encuentra en variados hábitats boscosos, incluyendo bosques húmedos, secos y pinares.

---

## Amenazas

La pérdida de hábitat y el disturbio como resultados de la tala de bosques y la transformación de tierras para la agricultura, y la persecución humana (porque se alimentan de aves de corral) son las causas fundamentales de su decline.

## Estado de conservación

En peligro



## Gavilán Batista

El Gavilán Batista (*Buteogallus gundlachi*) es un ave rapaz de la familia Accipitridae, endémica de Cuba, que habita la zona costera y los cayos del archipiélago, concentrándose fundamentalmente hacia el centro del país.



### **Características**

Esta rapaz es de color pardo-negro, con la cera y las patas amarillo-anaranjadas. Tiene una cola corta con una banda blanca ancha en el medio de esta y hacia la punta otra banda mucho más delgada. Tiene parches blancos en la base de las plumas primarias de vuelo.



### **Alimentación**

Se alimenta fundamentalmente de cangrejos, pero también devora con menor frecuencia otras presas como ciempiés, mamíferos y algunas aves.

### **Reproducción**

Se reproducen entre marzo y junio. El nido lo construyen en zonas de manglares, a una altura de 5m. Ponen generalmente 2 huevos que eclosionan pero solo llega a volar un pichón del nido.

### **Hábitat**

Al Gavilán Batista lo podemos encontrar en zonas de manglares costeros y cayos. También en lagunas costeras, playas, uverales, sobre vegetación de costa y en bosques muy próximos a la costa.

### **Amenazas**

Como esta especie es especializada por su dieta y el tipo de hábitats donde se encuentra, está amenazada por la transformación de la vegetación costera y las playas con fines turísticos. Actualmente la distribución de la especie coincide con los sitios con desarrollo turístico en el país, lo que aumenta la fragilidad de las poblaciones de esta ave.

## Estado de conservación

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza esta especie se considera como *Casi Amenazado*. Sin embargo, Freddy Rodríguez Santana, especialista de este grupo de aves, considera que la especie está *En Peligro* por la disminución de las áreas de ocupación de este gavilán, dadas por la transformación del hábitat.



## Gavilán de Monte

El Gavilán de Monte (*Buteo jamaicensis*), también conocido como **gavilán colirrojo** es una especie de ave de la familia Accipitridae ampliamente distribuida desde Alaska hasta las Antillas. Es una de las rapaces más abundantes y más utilizadas en la cetrería en Norteamérica.



### **Características**

Esta rapaz recibe su nombre debido al color de la superficie superior de su cola, un tono que va desde un rojo anaranjado o incluso rosa pálido hasta un rojo intenso, y que aparece normalmente a partir del año de edad. En la gran mayoría de los ejemplares adultos al final de su cola aparece una banda ancha y oscura de color negro. La superficie inferior de su cola es de un blanco intenso, que en algunos ejemplares llega a adquirir un color plateado.

Los machos pueden pesar entre 1.5 y 2.9lb y miden 45-60 cm. Las hembras pueden pesar entre 2 y 4.4lb y miden de 48 a 65cm. Estas son hasta un 25% más grande que los machos.

Esta rapaz tiene las alas largas y anchas. El vientre es blanquecino con una banda de color marrón oscuro a través del mismo, formada por bandas horizontales en el patrón de las plumas. El pico es corto y oscuro, con la forma de gancho característica de aves rapaces. La cabeza a veces puede parecer pequeña en tamaño respecto al cuerpo grueso. La cera y las patas son amarillas. Los machos y las hembras son similares en cuanto al plumaje.

Las variaciones entre las subespecies del Gavilán de Monte son considerables, resultando a veces muy difíciles de clasificar o reconocer por la variación de tamaño y de plumaje. El plumaje de juvenil y adulto es muy similar para todas las subespecies, aunque estos últimos suelen tener las alas más anchas y la cola más corta.

Variaciones importantes entre juveniles y adultos son el color de la cola (no es roja todavía), la banda abdominal que suele ser más marcada en los jóvenes que en los adultos, el color amarillo del iris y la cola con bandas oscuras. Cuando las aves son maduras y alcanzan los 3 a 4 años de edad, el iris se oscurece en un tono rojizo-marrón.



### Vocalización

El canto del Gavilan de Monte es como un llanto, un grito ronco y áspero de 2 a 3 segundos, descrito como *kree-eee-ar* que comienza con un tono alto. Este canto puede parecer un silbato de vapor.

### Alimentación

El Gavilán de Monte es un carnívoro oportunista. Se alimenta fundamentalmente de pequeños mamíferos (ratones), pero también de aves y reptiles.



### Reproducción

Las parejas de esta rapaz permanecen juntas por varios años. Construyen nidos sobre las ramas de árboles grandes de 4 a 21m. Los nidos tienen generalmente un diámetro de 71 a 97cm. Ponen de 1 a 3 huevos entre marzo y abril, dependiendo de la disponibilidad de alimentos. Después de 28 a 35 días de incubación, los huevos eclosionan y los pichones se mantienen en el nido por 42 a 46 días.

### Hábitat

Esta rapaz es una de las más ampliamente distribuidas en América. Prefiere los hábitats mixtos de bosques y campos abiertos. Se pueden encontrar en desiertos, herbazales, humedales, regiones costeras, manglares, montañas, bosques tropicales, campos agrícolas y zonas urbanas.



### Estado de conservación

Preocupación menor



## **Gavilancito**

El Gavilancito (*Accipiter striatus*) es un ave rapaz de la familia Accipitridae que habita a lo largo del continente americano, desde Alaska hasta el norte de Argentina y sur de Brasil.



### **Características**

Tiene las alas anchas y redondeadas, con unas plumas primarias puntiagudas que se extienden hacia fuera como dedos cuando se está remontando, su cola es larga y ancha. De menor tamaño que el Gavilán Colilargo, los machos miden entre 24 y 27cm de largo y pesan unos 87-114g; las hembras miden entre 29 y 34cm y pesan entre 150 y 218g. El plumaje de las partes superiores es gris azulado a negruzco; las partes inferiores son blancuzcas, con líneas horizontales de color castaño en el pecho; presenta cuello, flancos y muslos de color castaño rojizo. La cola es atravesada por 3-5 bandas estrechas con punta blanca. Generalmente se observa de forma cuadrada cuando se pliega y puede parecer ligeramente redondeada cuando se extiende. Las hembras adultas tienen una coloración similar pero las partes superiores son más castaño-oliváceas y las partes inferiores menos barreadas que los machos. Las patas y los dedos son amarillos y largos. Los ojos son rojos en los adultos y amarillo pálido en juveniles.

En juveniles, la cabeza está manchada de color marrón grisáceo y blanco o en color marrón grisáceo y rojizo en la coronilla, nuca y los lados del cuello, con una franja superciliar pálida. La espalda, la rabadilla y las alas de color marrón oscuro a gris oscuro pardusco, con la espalda y las coberteras alares con margen pálido. Bajo las alas el color es blanco con un barreado café oscuro llamativo. Las partes inferiores del cuerpo de color blanco a crema con rayas en el pecho marrón oscuro, en el vientre y costados.



**Especies similares:** Gavilán Colilargo

---

## **Alimentación**

Es una pequeña ave rapaz cazadora de aves cantoras. Caza volando a baja altura, entre árboles y arbustos, tras una breve y veloz persecución. En vuelos más abiertos y altos, o cuando migra, parece faltarle potencia. También puede alimentarse de pequeños mamíferos y en ocasiones, de grandes insectos.

## **Reproducción**

Se reproduce en Alaska y la parte central de Canadá hasta el centro de México y las Antillas Menores, en bosques de varios tipos, fundamentalmente los que incluyen coníferas.

Inverna desde el sur canadiense, Panamá y las Antillas hasta Uruguay y el norte de Argentina.

Construyen los nidos con las ramas de árboles altos caducifolios o coníferas, escondidos entre el follaje. La hembra pone de 2 a 8 huevos, más comúnmente 4 ó 5, de 37,6 por 30 mm, con marcas de variados colores. La incubación dura de 30 a 35 días. Después de la eclosión, las crías son alimentadas durante 16 a 23 días por la hembra, mientras que el macho defiende el territorio. Los pichones comienzan a volar con un mes de edad y dependen de sus padres para la alimentación y la protección por otras 4 semanas.

## **HÁBITAT**

Esta rapaz habita una amplia variedad de hábitats, dependiendo de la región, se puede encontrar en bosques boreales de coníferas, en bosques deciduos templados, en bosques nublados tropicales y subtropicales, bosques de galería y sabanas semi-abiertas.



## **Amenazas**

Alteración del hábitat, específicamente por la tala de los bosques.

---

# Estado de conservación

## Preocupación menor

